

## Lolium perenne

Eines der wichtigsten und am weitesten verbreiteten Futtergräser mit schneller Etablierung, guter Bestockungsfähigkeit, ausgezeichneter Reaktion auf Stickstoff und hoher Eignung für Weidenutzung. Im Vergleich zu anderen Arten ist Deutsches Weidelgras besser verdaulich, wodurch eine hochverdaulichere Trockenmasseproduktion erreicht wird.

## Barimero



### Rising star in multi-purpose

- Spätes diploides Deutsches Weidelgras.
- Hervorragende Leistung in Beweidungs- und Schnittsystemen.
- Hohe Krankheitsresistenz.
- Herausragende Ausdauer.
- Offiziell gelistet in: Deutschland, Niederlande.



Barimero

	Ährenschieben Kategorie	Gesamt-TME	TME erster Schnitt	Widerstand Kronenrost	Erneutes Ährenschieben 3. Schnitt*	Sward density
FORZA	spät-sehr spät	103	107	75	3,2	6,1
<b>BARIMERO</b>	<b>spät-sehr spät</b>	<b>103</b>	<b>101</b>	<b>106</b>	<b>2,5</b>	<b>6,4</b>
RESPECT	Intermediär	101	104	67	3,8	6,4
MELLUCK	spät-sehr spät	100	94	115	2	6,8
SPONSOR	spät-sehr spät	99	103	97	3,1	6,3
LICAMPO	Spät	98	104	101	3,4	6,7
ARIVICOLA	früh	97	88	85	1,9	6,3
BARNHEM	Sehr spät	96	90	96	2,6	6,4
LIPRESCO	früh	95	71	29	4,7	6,3
LILORA	früh intermediär	86	63	24	3,7	6,9
AVG. All tested		100	95	100	3,1	6,2

\*Niedrige Bewertung = geringes erneutes Ährenschieben

Quelle: Bundessortenamt (BSA) – Deutschland. Offizielle Sortenversuche, 13 Standorte. Vergleichstests mit Beispielsorten.

	Zeitpunkt Ährenschieben	Ausdauer	Winterhärte	Widerstand Kronenrost	TM-Ertrag erster Schnitt	TM-Ertrag Beweidung	TM-Ertrag Schnitt	TM-Ertrag Gesamtdurchschnitt
Barimero	6-jun	8,4	7,2	8,1	104	104	105	104
Romark	3-jun	8,0	7,1	7,6	99	103	100	102
Bartombso	11-jun	8,3	7,2	7,6	100	101	104	102
Melluck	4-jun	8,5	7,0	8,1	100	102	101	102
Bovini	6-jun	8,0	6,9	7,7	99	101	103	102
Humbi 1	5-jun	7,9	7,2	8,2	98	102	100	102
Burilina 1	3-jun	8,0	7,0	7,6	99	100	102	101
Zenital	4-jun	8,2	7,0	8,3	96	101	100	100
Jalinas	3-jun	8,1	6,8	7,5	102	100	101	100
Tomaso	3-jun	8,2	7,2	7,4	100	100	100	100
Tornado	4-jun	8,2	7,2	7,2	97	100	100	100
Asturion	4-jun	8,0	6,9	7,8	100	99	100	99
Candore	4-jun	8,3	7,1	8,2	95	99	100	99
Cardo	3-jun	8,3	7,0	7,7	98	100	97	99
Astorga	4-jun	8,2	6,8	8,5	92	98	98	98
Bakuri 1	6-jun	8,1	7,4	8,4	96	98	99	98
Cadens	8-jun	7,9	7,4	8	92	97	96	96

\*Quelle: CSAR, Niederlande, Offizielle empfohlene Grassortenliste, spätes diploides Deutsches Weidelgras.

### Spezifikationen



## Lolium perenne

Art	Lolium perenne
Ährenschieben	Spät
Ploidie	Diploid

Eines der wichtigsten und am weitesten verbreiteten Futtergräser mit schneller Etablierung, guter Bestockungsfähigkeit, ausgezeichneter Reaktion auf Stickstoff und hoher Eignung für Weidenutzung. Im Vergleich zu anderen Arten ist Deutsches Weidelgras besser verdaulich, wodurch eine hochverdaulichere Trockenmasseproduktion erreicht wird.

